



Paracetamol **650 mg**

Venta Libre
Industria Argentina

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO. ¿Qué contiene Tafirol Forte Comprimidos? Cada comprimido de 650 mg contiene: Ingredientes activos: Paracetamol 650,00 mg. Ingredientes inactivos: Povidona, Almidón, Ácido esteárico, Almidón glicolato de sodio, c.s. **Acción terapéutica:** Analgésico y

antifebril. **¿Para qué se usa Tafirol Forte Comprimidos?** Tafirol Forte está indicado para el alivio sintomático de dolores (de cabeza, menstruales, musculares) leves a moderados, alivio de estados gripales y/o resfriados y reducir la fiebre. **¿Qué personas no pueden recibir Tafirol Forte Comprimidos?** • Alergia conocida al paracetamol. • No debe iniciarse el tratamiento en pacientes a quienes la aspirina u otros analgésicos, antiinflamatorios les producen asma, rinitis, urticaria o reacciones alérgicas severas. • Úlcera péptica activa. Antecedentes de úlcera recurrente. Tafirol Forte no puede ser administrado en caso de enfermedad hepática, hepatitis virales, trastornos renales, o alcoholismo. • Enfermedad del riñón, corazón o pulmones. • Anemia (disminución de los glóbulos rojos o de la hemoglobina). • Menores de 12 años. **¿Qué cuidados debo tener antes de tomar este medicamento?** "El paracetamol puede causar daño hepático cuando se ingiere en altas dosis". No tomar más cantidad de medicamento que la recomendada en el apartado (¿Cómo se usa este medicamento?). Si tiene antecedentes de enfermedad del tracto digestivo superior (boca, faringe, esófago y estómago), por la posibilidad de sangrado, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. No ingiera otro medicamento que contenga paracetamol u otro analgésico. Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica. Si usted consume 3 o más vasos diarios de bebida alcohólica consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El paracetamol puede tener interacciones con algunos de los siguientes medicamentos: Anticoagulantes orales; antiepilépticos (utilizados para el tratamiento de crisis epilépticas); diuréticos (utilizados para aumentar la eliminación de orina); isoniazida (utilizado para el tratamiento de la tuberculosis); rifampicina (utilizado para el tratamiento de la tuberculosis); medicamentos antiinfecciosos. No utilizar con otros analgésicos (medicamentos que disminuyen el dolor). Si usted está tomando algún medicamento, está embarazada o dando el pecho a su bebé consulte a su médico antes de ingerir este medicamento. **¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando este medicamento?** Pueden aparecer efectos no deseados causados por este medicamento como: erupciones cutáneas (hinchazón y enrojecimiento de la piel), alteraciones en la sangre (disminución de plaquetas), náuseas, vómitos y malestar gástrico. Si algo de esto sucede suspenda la medicación y consulte con su médico. **¿Cómo se usa este medicamento? Adultos y Niños mayores de 12 años:** 1 comprimido cada 6 u 8 horas. Dosis máxima: **4 gramos por día** (6 comprimidos de 650 mg). **Pacientes mayores a 65 años o menores de 12 años:** consulte con su médico. No utilizar por más de 5 días para el dolor y 3 días para la fiebre, o bien si el dolor o la fiebre empeoran o aparecen otros síntomas, suspenda la medicación y consulte a su médico. **ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO. Presentaciones:** Envases conteniendo 10, 20, 30 y 300 comp. de 650 mg cada uno (último tiene uso como expendedor).



Genomma Lab.®