



Paracetamol **300 mg**  
Diclofenac Sódico **25 mg**

Cápsulas blandas

Venta Libre - Industria Argentina

**LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO.**

**¿Qué contiene Tafirol Plus Rápida Acción?**

Cada Cápsula contiene: Activos: Paracetamol 300 mg, Diclofenaco Sódico 25 mg. Excipientes: Colorante rojo punzó 4R (CI 16255) 0,464 mg, Cápsula Polietilenglicol 400 580,6 mg, Solución Propilenglicol 55,2 mg, Solución agua purificada 88 mg, Solución Povidona 55,2 mg, Solución gelatina 251,654 mg, Cápsula Solución Sorbitol / Glicerina (50:50) 151,546 mg, Cápsula Lecitina de soja trazas, triglicéridos de cadena media trazas, tinta blanca para impresión ribbon printing trazas.

**Acciones:** Analgésico y Antiinflamatorio.

**¿Para qué se usa Tafirol Plus Rápida Acción?** Este medicamento está indicado para aliviar dolores de espalda, dolores musculares y de articulaciones. Dolores Menstruales.

**¿Qué personas NO pueden recibir Tafirol Plus Rápida Acción?** No use este medicamento si: • Es alérgico a Diclofenac, Paracetamol, aspirina, u otros analgésicos / antiinflamatorios similares o a otros ingredientes del producto. • Tiene o ha tenido úlcera gastrointestinal. • Está tomando otros productos sean estos anticoagulantes o diuréticos. • Padece de alcoholismo, hemorragias, alteraciones de la coagulación y/o enfermedades del hígado, riñones o corazón. • Menores de 15 años.

**¿Qué cuidados debo tener antes de tomar este medicamento?** Tenga especial precaución y consulte con su médico antes de tomar este medicamento si: • Consume algún medicamento por alguna enfermedad crónica. • Tiene problemas de estómago (ardor estomacal, acidez). • Si usted consume tres (3) o más vasos diarios de bebida alcohólica. • Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando el pecho a su bebé consulte a su médico antes de tomar este medicamento. • No utilice este medicamento si el envase de las cápsulas (blister) está abierto o presenta marcas de adulteración. Este medicamento no debe consumirse después de la fecha de vencimiento que figura en el envase.

**¿Cómo se usa este medicamento?** Vía de administración oral, preferentemente con un vaso completo de agua indistintamente antes, durante o después de una comida ligera. **Adultos y mayores de 15 años:** 1 cápsula blanda cada 8 horas. Dosis Máxima: **3 cápsulas blandas por día, repartidas cada 8 horas. Niños menores de 15 años o adultos mayores de 65 años:** Consulte a su médico. No utilizar por más de 5 días sin consulta médica. Si los síntomas persisten o empeoran por más 72 horas consulte a su médico.

**¿Qué cuidados debo tener mientras tomo este medicamento?** Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento, como por ejemplo: náuseas, vómitos, diarrea o constipación, dolor abdominal, mareos, erupción en la piel, disminución en el recuento de plaquetas en el análisis de sangre.

**MANTENER TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ANTE CUALQUIER DUDA, CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.**

**Presentaciones:** Envases conteniendo 8 o 16 cápsulas blandas.



**Genomma Lab.®**